

Det kan være  
**færligt**, hvis du  
 tager Methotrexat  
 på en anden måde  
 end aftalt med  
 lægen.

Hvis du har taget for meget  
 Methotrexat, eller indtaget medicinen på  
 en anden måde end aftalt, skal du straks  
 kontakte din læge, skadestuen  
 eller apoteket.

# Vigtig information

Til dig, der bruger  
**Methotrexat** mod gigt  
 eller psoriasis.

Møn	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn
			●			
			●			
			●			
			●			
			●			
			●			

Methotrexat må kun tages **ÉN GANG OM UGEN** og altid på samme ugedag. Også selvom det kan virke forkert at skulle tage så mange ens tabletter på én gang.

Du skal tage **METHOTREXAT** hver:


*Skriv ugedag her*

Hvis du glemmer at tage Methotrexat på ugedagen, skal du kontakte din læge for at høre, hvad du skal gøre.

Det er almindeligt at opleve **BIVIRKNINGER** som kvalme, opkast, manglende appetit og mavesmerter, især i starten af behandlingen. Ubehaget kan ofte mindskes ved at tage tabletterne til aftenmaden eller inden sengetid.

Læs indlægssedlen for flere informationer.

## Kontakt din læge, hvis du oplever



Små **BLØDNINGER** i hud og slimhinder (viser sig som næseblod, blødning fra tandkødet eller røde/blå pletter på huden)



Tendens til infektioner, især halsbetændelse og **FEBER**



At du pludselig bliver **STAKÅNDET** eller hoster