

apotek

Børneorm



BØRNEORM

Børneorm er en ufarlig infektion med orm i tarmen.

Ormen er gulhvid, cirka 1 cm lang og meget tynd. Den ligner en lille 'sytråd' og kan ses uden på afføringen eller omkring endetarmens åbning.

Det er forskelligt, hvor mange børneorm der er i tarmen, når man er smittet. Nogle har kun få orme, andre flere hundrede.

Det er oftest børn i alderen 5 til 10 år, der får børneorm. Børneorm ses sjældent hos børn under 2 år og hos voksne.

SYMPTOMER

Børneorm giver en voldsom kløe omkring endetarmens åbning. Kløen er værst aften og nat – det tidspunkt, hvor ormen kravler ud af endetarmen for at lægge æg omkring endetarmens åbning.

Symptomerne på børneorm er – ud over kløe - søvnproblemer, rastløshed og irritabilitet. Det er dog ikke alle, der har børneorm, der oplever symptomer.

SMITTE

Børneorm smitter via æg fra ormen – selve ormen smitter ikke. Æggene kommer ind i munden, synkes og kommer ned i tarmen, hvor de bliver til orme. En orm kan lægge over 10.000 æg.

Æggene udskilles fra endetarmen og spredes til legetøj, håndklæder, sengetøj eller hænderne, hvis man fx klør sig. Herfra kan andre få æggene på hænderne og derfra ind i munden. På den måde kan man også smitte sig selv igen. Æggene

kan desuden spredes gennem mæd og drikke, som har været berørt af hænder, hvor æggene sidder på huden eller under neglene.

Det sker desværre ofte, at en familie bliver ramt af børneorm gentagne gange.

Hvis ens barn er smittet, bør man fortælle institution og skole om det, så de øvrige forældre kan blive orienteret.

HVEM SKAL BEHANDLES?

Det er vigtigt, at alle personer, der bor sammen med den smittede, behandles – også dem, der ikke har symptomer på børneorm. Husk at behandlingen skal gentages.

MEDICIN MOD BØRNEORM

Børneorm behandles med medicin, som dræber ormene, men ikke æggene. Derfor skal man altid behandle flere gange, så alle æg kan udvikle sig til orme mellem hver behandling.

Det er vigtigt at følge vejledningen til punkt og prikke, når man anvender medicin mod børneorm. Spørg på apoteket, hvordan medicinen skal anvendes.

Efter påbegyndt behandling kan man komme i institution eller skole.

Vær opmærksom på, at ormene kan overleve et par dage efter behandling. Derfor kan man risikere at se levende orme i afføringen, selv om behandlingen er sat i gang.

Er der fortsat gener, efter behandlingen er færdig, bør man søge læge.

DET KAN DU SELV GØRE

Hvis du er smittet med børneorm, er det vigtigt med god hygiejne:

- o Grundig håndvask især efter toiletbesøg og før hvert måltid
- o Korte og rene negle
- o Daglig vask med vand af området omkring endetarmsåbningen – husk grundig håndvask bagefter
- o Jævnlig vask af håndklæder, sengetøj og undertøj på minimum 60 grader



apotek

VARENR.: 806191 12/19

PÅ APOTEKET

På apoteket kan du få hjælp til og rådgivning om alle typer medicin. Alt personale er faguddannet og kan blandt andet svare på spørgsmål om recept- og håndkøbsmedicin, bivirkninger og medicin til børn og fortælle hvad du skal være

opmærksom på, hvis du for eksempel tager flere forskellige typer medicin samtidig. Apoteket er stedet, hvor du køber din medicin.

Læs mere på apoteket.dk, eller spørg på apoteket.